

، حمض البوريك

التركيب:

بورون (B) الكلي	17%
بورون (B) قابل للذوبان في الماء	17%

مكونات حمض البوريك

الخصائص التقنية:

BORO 17 مسحوق قابل للذوبان للاستخدام على الجذور والأوراق. يضمن المستوى العالي من البورون توفير العنصر المغذي المناسب خلال مراحل الإخصاب الدقيقة. ينظم في النبات امتصاص العناصر مثل الكالسيوم ونقل السكريات. يستخدم BORO 17 على جميع المحاصيل الأكثر حساسية لنقص البورون مثل العنب وبنجر السكر والفواكه والخضروات وأشجار الزيتون، حيث يزيد من خصوبة حبوب اللقاح وبالتالي عقد الثمار والإثمار.

الخصائص الفيزيائية:

مسحوق قابل للذوبان

الرقم الهيدروجيني لمحلول 1%: 6

التوصيل الكهربائي عند 1% (مللي سيمنز/سم): 0.51

طريقة وجرعات الاستخدام:

BORO 17 قابل للخلط مع المبيدات الفطرية والحشرية. لضمان أعلى استفادة من المنتج يجب تجنب استخدام المنتج في الساعات الحارة جدا من اليوم. ينصح دائما في حالة الخلط بأي مركب آخر استخدام عينة صغيرة للتأكد من قابلية المركبات للخلط. في الصوب يتم خفض الكمية المستخدمة 30%

الرش الورقي مع الرش 400 لتر/الفدان من الماء	في الصوب يتم خفض الكمية المستخدمة 30%	الفاكهة وبنجر السكر ودوار الشمس وزهور القطف والخضروات	2-3 معاملات بفواصل 10-12 يوم قبل الإزهار وعند الإزهار يوصى باستخدامه مع HPF 150 سم ³ /100 لتر (الأحماض الأمينية)	100-150 جرام/ 100 لتر
الاستخدام الأرضي		الفواكه، الكيوي، العنب، الموالح، أشجار الزيتون	يوصى باستخدامه مع AGRIAMMIN Plus أو AGRIVIVA (الأحماض الأمينية) 2.5-3.3 كجم/الفدان	2-2.5 كجم/ الفدان
		الخضروات، الأزهار، المحاصيل التكتيفية	20-30 جرام/ نبات	

عبوات: 1 - 5 - 10 - 25 كجم