

## التركيب:

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 9%  | نيتروجين الكلي (N)                            |
| 9%  | نيتروجين (N) نيتريك قابل للذوبان في الماء     |
| 10% | أكسيد الكالسيوم القابل للذوبان في الماء (CaO) |
| 5%  | أكسيد المغنسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) |

## الخصائص التقنية:

CALMAG هو سماد نيتروجيني سائل يحتوي على المغنسيوم والكالسيوم عالي النقاء للاستخدام الورقي والجذري. يوصى باستخدام CALMAG للوقاية من بعض الأمراض الفسيولوجية التغذوية وعلاجها مثل: النقر المرة، تساقط الأوراق، وتجهيف جذور العنب، وإعراض فسيولوجية عديدة. يتمتع CALMAG بقدرة علاجية ممتازة، وذلك بفضل وجود الكالسيوم الذي يزيد من مقاومة جدران الخلايا، ويحسن تماسك الثمار ومدة صلاحيتها وكيفية التعامل معها، ويقلل من ظاهرة التشقق (مقاومة التشقق). يعمل CALMAG أيضًا على تحسين التغذية بالنيتروجين في جميع الفصول، حتى في درجات الحرارة الباردة.

## الخصائص الفيزيائية:

الثقل النوعي: 1.5 - pH لمحلول 1%: 6 - التوصيل الكهربائي عند 1% (mS/cm): 0.82

## طريقة وجرعات الاستخدام:

CALMAG متوافق مع جميع الاسمدة. ينصح دائما عمل اختبارات صغيرة لتقدير مدي توافق المنتج بالتوافق مع المنتجات الأخرى. في حالة الصوب تخفض الجرعة 30%.

| الوقت<br>الرش | الوقت<br>الصوب<br>السماد<br>المتاح<br>في<br>الوقت<br>الرش | الفاكهة                      | كل 7 أيام مع القيام بأول<br>معاملة بنهاية الأزهار وحتى<br>وصول الثمار إلى حجم<br>البندقة | 500-400 سم <sup>3</sup> /لتر  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|               |                                                           | الخضروات                     |                                                                                          | 2-1.6 لتر/الفدان              |
|               |                                                           | نباتات الزينة وزهور<br>القطف | كل 10 أيام                                                                               | 300-200 سم <sup>3</sup> /لتر  |
|               |                                                           | الفاكهة والعنب<br>والموالح   | من نهاية العقد مقسمة<br>على 4-5 مرات                                                     | 120-80 كجم /الفدان            |
|               |                                                           | خضروات ثمرية                 | من نهاية العقد مقسمة<br>على 3-4 مرات بفاصل 10<br>أيام                                    | 30-20 كجم/1000 م <sup>2</sup> |
|               |                                                           | خضروات ورقية                 | قبل التفاف الرأس ومقسمة<br>على 2-3 مرات بفاصل 7<br>أيام                                  | 15-10 كجم/1000 م <sup>2</sup> |

عبوات: 1.5 - 6 - 12 - 25 كجم