أف 15-7-5

F 15-7-5

سماد ثلاثي يحتوي على نسبة منخفضة من الكلور والبيوريت

التركيب:

النيتروجين الكلي (N)	%15
النيتروجين نيتريك (N)	%1.5
النيتروجين في صورة يوريك (N) (نسبة منخفضة من البيوريت)	%13.5
خامس أكسيد ثنائي الفوسفور قابل للذوبان في الماء (P_2O_5)	%7
اكسيد البوتاسيوم قابل للذوبان في الماء (K_2O)	%5

الخصائص التقنية:

F 15-7-5 هو سماد ورقي وجذري سائل يحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم التي يمكن استيعابها بسهولة. بسبب تركيبته F 15-7-5 يحسن التمثيل الغذائي للنبات والنشاط الخضري والمظهر الجمالي لنباتات الزينة. ويفضل استخدام F 15-7-5 عندما تؤدي درجات حرارة التربة المنخفضة إلى إبطاء امتصاص العناصر الغذائية.

الخصائص الفيزيائية

الثقل النوعي: 1.24 - pH لمحلول 1%: 5.28 – التوصيل الكهربي عند 1%o أو (mS/cm): 0.60

طريقة وجرعات الاستخدام:

F 15-7-5 متوافق مع معظم المبيدات الحشرية. يجب عليك دائمًا إجراء اختبارات صغيرة للتحقق من التوافق مع المنتجات الأخرى. تجنب الخلطات مع الكبريت والزيوت المعدنية والمنتجات القائمة على النحاس والمنتجات ذات التفاعل القلوي. تجنب المعاملة خلال الساعات الأكثر حرارة من اليوم. في حالة الاستخدام داخل الصوب يتم تقليل المعاملة بالمنتج حوالي 30%.

الرش الورقي	في الصوب يتم خفض الكمية المستخدمة 30%	الفاكهة والعنب والموالح والزيتون		3.33-1.66 لتر/الفدان
		الخضروات والمحاصيل الحقلية		3.33-2 لتر/الفدان
		زهور القطف ونباتات الزينة		300-100 سم^3/100 لتر
		التنظيف من البسيلا	المعاملة في الصباح الباكر مع 600 لتر ماء/الفدان	600-500 سم^3/100 لتر
الاستخدام الارضي التسميد مع الري		الفاكهة والعنب والموالح والزيتون والكيوي	من بداية المراحل الخضرية وحتى نضج الثمار	80-40 كجم/الفدان
		الخضروات والفراولة	من بداية خروج الاوراق وحتى امتلاء الثمار	20-15 كجم/1000 م^2
		نباتات الزينة المزهرة	من المراحل الاولى وحتى الأزهار	15-12 كجم/1000 م^2
		مسطحات خضراء ومشاتل	في مراحل النمو الاولى	15-10 كجم/1000 م^2

عبوات 1,3 - 6 -12 - 25 - 250 كجم